

ひじ・ひざ・かかとの荒れ、ひび、あかぎれの治療薬

ヒビケアFT軟膏

販売名：ヒビケアFT


ガチゴチに硬くなった皮ふの治りにくい「パッキリ」割れに

かかとやひざなどは、もともと角層が厚く、乾燥などによりガチゴチに硬く荒れた状態になりやすいところ。さらに、歩くときなどに体重や力がかかるため、「パッキリ」割れが起こりやすく、いったん割れてしまうと治りにくくなります。

ヒビケアFT軟膏は、そんな硬くなった皮ふの「パッキリ」割れに適した治療薬です。

■硬くて割れやすい皮ふ（ひじ・ひざ・かかとなど）

健康な皮ふでは、皮ふの代謝（新しい皮ふと古い皮ふの生まれかわり）がスムーズに起き、やわらかい皮ふ状態を保っています。しかし、寒さや加齢で皮ふの細胞が元気を失うと皮ふの代謝が遅くなり、本来はがれるはずの古い角層が厚く積み重なっていきます。この状態に乾燥が加わると、皮ふはガチゴチに硬くなり、割れやすい荒れた状態になってしまうのです。



■「ひび修復を促進」+「皮ふの代謝を改善」するヒビケアFT軟膏

- 割れた皮ふ組織に直接はたらき修復を助けるアラントインと、肌細胞に元気を与え修復を助けるパンテノールをW配合。この2つの「ひび修復促進成分」が治りにくい「パッキリ」割れたひび割れをしっかりと治療します。
- 「ビタミンA油」が皮ふの代謝を改善して、ガチゴチに硬くなった皮ふの荒れをなめらかにし、割れにくい状態にしていきます。

さらに、血行促進成分、保湿成分が配合されていますので、患部の回復を早め、ガチゴチ皮ふにうるおいを与えます。また、かゆみをおさえる成分がひび・あかぎれに伴うかゆみの症状をやわらげます。ヒビケアFT軟膏は、これらの成分がバランスよく配合され、患部全体を正常な状態に近づけていきます。



使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

効能

ひじ・ひざ・かかとのあれ、ひび、あかぎれ、指先・手のひらのあれ、しもやけ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後1カ月以上です。
- (2)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

《チューブの開け方》



成分とそのはたらき

有効成分(100g中)

成分	分量	はたらき
ビタミンA油	0.5g (ビタミンAとして 500000国際単位)	皮膚の代謝を改善し、皮膚の荒れをなめらかにします。
アラントイン	0.2g	割れた皮膚組織の修復を助けます。
パンテノール(プロビタミンB5)	1.0g	肌細胞の正常なはたらきを助けます。
トコフェロール酢酸エステル	2.0g	血行を促進し、患部の回復を早めます。
グリセリン	40.0g	保湿成分で、皮膚にうるおいを与えます。
ジフェンヒドラミン	0.5g	ひび・あかぎれに伴うかゆみをおさえます。

添加物としてエデト酸Na、BHT、ステアリルアルコール、トリイソオクタン酸グリセリン、パルミチン酸セチル、ペヘニルアルコール、マイクロクリスタリンワックス、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンペヘニルエーテル、クエン酸を含有します。

本剤にステロイド成分は配合されていません

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(ケース及びチューブに西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。
- (5)使いやすいラミネートチューブです。破れにくい特長がありますが、強く押すと中身が飛び出す場合があります。チューブ尻から順次軽く押し出すようにして使用してください。

お子さまが誤ってヒビケアFT軟膏を口にしたら場合

- ①まず、口の中の物をふき取ってあげてください。
- ②少しなめた程度では影響はありません。ただし、たくさん口にすると眠気があらわれることがあります。
- ③1時間ほど様子を見て、呼吸などに異常がある場合は、医師に診てもらってください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
☎ 076-472-0911 [電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～17:00]

製造販売元

MUHI

株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地

®登録商標

SS05