

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

鎮痒消炎剤

むだ毛処理後などの赤み・ブツブツに  
かゆみ・皮ふ炎治療薬

クリーム

# ケアレケア<sup>®</sup>

販売名：ケアレケア

## むだ毛処理後の 赤み・ブツブツ・かゆみ……なぜ？

それは、「剃り・抜き」などの行為が、大切な皮ふ組織を破壊してしまうからです。

- ①カミソリなどによる「剃り」は肌のバリア機能をなす角質層を削り取り、毛抜きなどによる「抜き」は毛穴付近の角質層だけでなく毛根部の皮ふ組織も傷めます。
- ②これら皮ふ組織の破壊によって、かゆみの原因となる炎症反応が起こります。
- ③その結果、赤み・ブツブツ・かゆみなどの“ケアレトラブル”が発生するのです。



また、皮ふ組織の修復が終わらないうちにむだ毛処理をくり返すと、組織の破壊が進行し、肌の抵抗力は一層低下します。その結果、汗・衣服のスレ・雑菌などのわずかな刺激に対しても深刻なトラブルをくり返してしまう「ケアレ肌」状態へとおちいってしまうのです。

## むだ毛処理後などの赤み・ブツブツに ケアレケア

そんな「ケアレ肌」を治すには、①今起きている赤み・ブツブツ・かゆみを早く治すとともに、②むだ毛処理で傷んでしまった皮ふ組織を修復し、肌の抵抗力を一刻も早く回復させることが大切です。

ケアレケアは、赤み・ブツブツを治療する炎症成分(グリチルリチン酸二カリウム)とかゆみをすばやく止める成分(ジフェンヒドラミン)に、傷んだ皮ふ組織をしっかり修復する組織修復成分(アラントイン)、傷んだ肌を元気にするビタミン(パントテノール)をプラス配合。ケアレトラブルを治療し、ケアレ肌を健康な状態に導きます。



## むだ毛処理後のこんなお悩みに

- ①赤みやブツブツが気になりスカートがはけない。
- ②かゆみが強くて寝ている間にかきこわしてしまう。
- ③むだ毛処理後のトラブル症状がなかなか治らなくなってきた。
- ④トラブルがイヤで、むだ毛処理をためらうようになってきた。

ケアレケアは、顔・ワキ・ウデ・アシ・Vゾーンなど全身の治療に使えます



## 使用上の注意

### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
  - (3)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能


かゆみ、皮ふ炎、かぶれ、しっしん、ただれ、じんましん、あせも、しもやけ、虫さされ

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### <用法・用量に関連する注意>

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後1カ月以上です。
- 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- 粘膜部分には使用しないでください。
- 敏感な部分(顔面、首から上部、陰部など)や小児に使用する場合は、あらかじめお肌の目立たない部分に少量塗布し、翌日様子を見てから使用してください。



### チューブの使い方



## 成分とそのはたらき

有効成分(100g中)

| 成分            | 分量   | はたらき                     |
|---------------|------|--------------------------|
| ジフェンヒドラミン     | 1.0g | かゆみを止めます。                |
| グリチルリチン酸二カリウム | 0.5g | 赤み・ブツブツをおさえます。           |
| アラントイン        | 0.5g | むだ毛処理などで傷んだ皮ふ組織の修復を助けます。 |
| パンテノール        | 5.0g | 皮ふ組織の正常なはたらきを助けます。       |

添加物としてエデト酸Na、カルボキシビニルポリマー、グリシン、グリセリン、スクワラン、ステアリルアルコール、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、トリソオクタン酸グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ペヘニルアルコール、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ステアリン酸ソルピタン、リン酸二水素Naを含有します。

本剤にステロイド成分は配合されていません

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限(ケース及びチューブに西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。
- 使いやすいラミネートチューブです。破れにくい特長がありますが、強く押すと中身が飛び出す場合があります。チューブ尻から順次軽く押し出すようにして使用してください。

## お手当てのポイント

- ☆赤み・かゆみが出たら、なるべくはやく塗ってください。
- ☆赤み・ブツブツが治るまで、1日数回こまめに塗ってください。
- ☆かかないでください。かきこわずと症状が悪化します。

### — お子さまが誤ってケアレケアを口にしたら場合 —

- ①まず、口の中の物をふき取ってあげてください。
- ②少しなめた程度では影響はありません。ただし、たくさん口にするると眠気があらわれることがあります。
- ③1時間ほど様子を見て、呼吸などに異常がある場合は、医師に診てもらってください。

ケアレケア相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地  
☎ 076-472-0019 (電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～17:00)