



肌を治すチカラ

MUHI

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

鎮痒消炎剤

ヤブ蚊・ダニなどによる
赤くはれる 虫さされ・かゆみにすばやく効く

ムヒアルファ[®] SII

販売名：ムヒアルファ SII

☆かゆみ止め成分ジフェンヒドラミン塩酸塩を2倍に増量し、
瞬感力をさらに高めました。
(当社従来品比)

●すばやさにごだわった「瞬感処方」です。

ヤブ蚊・ダニなどによる赤くはれる虫さされやかぶれ、しっしんは、①かゆみ原因物質の放出、②炎症の発生、③かゆみ神経の興奮が原因で起こります。ムヒアルファ SIIは、炎症によく効く抗炎症成分(デキサメタゾン酢酸エステル)に、すばやくかゆみをおさえる成分(ジフェンヒドラミン塩酸塩)、スーッとする清涼感を与え、かゆみをしずめる成分(*l*-メントール、*d**l*-カンフル)を配合し、すばやさにごだわった瞬感処方で、かゆい皮ふ症状を元からしっかり治療します。

抗炎症成分

デキサメタゾン酢酸エステルが、かゆみ、はれ・赤みの原因である「炎症」の元にしっかり効きます。

かゆみ止め成分

ジフェンヒドラミン塩酸塩が、かゆみ原因物質(ヒスタミン)のはたらきをブロックし、かゆみをすばやくおさえます。

清涼感成分

l-メントール、*d**l*-カンフルが、スーッとする清涼感を与え、かゆみ感覚をすばやくしずめます。



ムヒアルファSIIの効果の模式図

●かぶれやしっしんにも効く、使用感の良いクリームです。

- ・虫さされだけではなく、アレルギー性のかぶれやしっしんの治療にも適したクリームです。
- ・べたつかず白く残らない、サラッとしたクリームです。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください(目安として顔面で2週間以内、その他の部位で4週間以内)

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
(4)患部が広範囲の人。
(5)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮 心 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

虫さされ、かゆみ、しっしん、皮ふ炎、かぶれ、じんましん、あせも、しもやけ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後6カ月以上です。
- (2)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分とそのはたらき

有効成分(100g中)

成分	分量	はたらき
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみ原因物質のはたらきをブロックします。
デキサメタゾン酢酸エステル	25mg	かゆみ、はれ・赤みの原因である炎症の元に作用するステロイド性抗炎症成分です。
l-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみ感覚をしずめます。
dL-カンフル	1.0g	清涼感を与え、かゆみ感覚をしずめます。
クロタミトン	5.0g	かゆみをしずめます。
グリチルレチン酸	0.2g	生薬由来成分で、かぶれなどの炎症をしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。

添加物としてエデト酸Na、アジピン酸ジイソプロピル、カルボキシビニルポリマー、ステアリルアルコール、トリイソオクタン酸グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ペヘニルアルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンペヘニルエーテル、ステアリン酸グリセリン、ジイソプロパノールアミン、リン酸水素Na、ポリプロピレングリコールを含有します。

<ムヒアルファSIIに配合されているステロイド成分について>

虫さされ、かゆみの治療には、かゆみをすみやかにしかもしっかりおさえ、かきこわし等による悪化を防ぐことが重要です。ステロイド成分は、虫さされ等によるアレルギー性の炎症をおさえますので、主にかゆみの長期化と悪化の回避に有効にはたります。特に、ヤブ蚊やダニ、ノミなどによるかゆみには、ステロイド成分が適しています。

ステロイド成分による副作用は、皮ふが薄い顔や首等にあわれやすく、顔の場合は、お酒を飲んだ時のように赤ら顔になることがあります。これらは、主に長期継続使用した場合に発生します。ムヒアルファSIIに配合されているデキサメタゾン酢酸エステルは、作用緩和なステロイド成分ですので、虫さされ等小さな患部に短期間使用する場合には副作用はほとんどありません。同じ部位に継続して使う場合は、顔には2週間以内、その他の部位は4週間以内を目安にしてください。早めに使って早めに治すことが、ステロイド成分配合剤の上手な使い方です。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(ケース及びチューブに西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

お手当てのポイント

☆患部を清潔にしてから塗布してください。

☆赤くなってはれが大きい場合は、氷や水で冷やしてください。

☆患部をかきむしらないでください。かきむしると症状が悪化し、あとが残ることがあります。早い対処で、かゆみや炎症をおさえることが大切です。

—おさまが誤ってムヒアルファSIIを口にしたら—

- ①まず、口の中の物をふき取ってあげてください。
- ②少しなめた程度では影響はありません。ただし、たくさん口にすると眠気があらわれることがあります。
- ③1時間ほど様子を見て、呼吸などに異常がある場合は、医師に診てもらってください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
☎ 076-472-0911 (電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～17:00)